四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百九十九

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈復勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣李斯咏

謄録舉人臣薛炳文

普濟方卷三百九十九　明　周王朱橚　撰

嬰兒諸疝諸蟲

諸疝　附論

夫腎主納氣乃人之氣海腎虛為風寒所乘為暑濕所襲為喜怒驚恐所傷而水結不散又與邪氣搏聚於中為奔疝為奔豚為小腸氣為膀胱等證不特外腎小腸作痛或攻刺腰脇或遊走背膂或氣搶心心下痛滿或

痛遶臍傍或脇之左右如盂或臍之上下如臂或腸中累累如桃李或胃脘覆大如盤或壯熱惡寒或洒淅寒熱有大小便秘者有裹急而下泄者其於陰間則卵有小大伸縮上下不常囊有腫脹急痛而發渴無定夾冷驚怒則塊物上逼囊根或攻腹脇皆謂腎氣治法大綱風則散之寒則温之暑則解其熱濕則滲其水驚怒則調其心氣水與氣搏則行其小便其間又以治腎氣藥參之大要流行疎利為先毋曰腎虚不敢疎泄蓋腎為

邪氣所干若非疎利病何由愈倘或姑息畏虛妄投剛補之劑使大小腑秘而不通邪氣入腹冲心危殆必矣然腎氣雖虛得之當明冷熱及冷熱不調之證蓋冷者脇邊及外腎清冷小便清而多遇寒則發熱者內夾暑氣或積酒毒熱藥則外腎與小腹俱熱小便數而澁遇熱則甚冷熱不調者小腹外腎乍冷乍熱大小便或澁或利用藥温凉流行疎導於其中矣若逆氣長吁中脘停酸躁悶嘔吐最為惡候乃天一生水腎實主宗筋聚

於陰氣必藉陽明胃土以養今脾土未强腎水既涸脾土又焦陰陽不升降榮衛不流行大小便秘澁腎胃兩虛必為酸汁而暴吐者難治

方

金鈴子丸出危氏方 治疝氣小腹痛引腰脊攣曲身不能直

木香 檳榔 三稜 蓬朮炮 青皮去白 陳皮 川楝肉 芫花醋浸炒 各半兩 辣桂 牽牛生取仁研 各二錢 川巴豆肉去油 一錢

右為末麵糊丸麻子大每丸空心午前各一服薑湯下

小檳榔丸 一名神効丸 出危氏方 治疝氣小腹痛引腰脊攣曲身不能直疝氣因何得邪風在腎經流傳并血聚如此漸成形冷氣結在臟因茲小腹疼本經無補法踈利藥通靈

芫花 醋浸炒 木香 檳榔 三稜 炒各半兩 茯苓 青皮去白 全蝎 肉桂 附子 炮 硇砂 各一分

右為末將硇砂浸洗去土頓在湯瓶上候成膏子和糖醋打麵糊丸如菉豆大每服三十丸空心温酒送下未効再服昔日有一人患此服之斷根今三十年不發矣

化生丸出楊氏家藏 治疝氣小腸痛上連腰脊曲飲食不進痿黃身不能直服此藥後宜灸脊俞三壯立瘥百藥俱試惟此最効

木香一分炒 檳榔半兩生 青皮巴豆炒半兩去巴豆 陳皮炮三稜莪朮用濕紙裹煨取出搥切炒 川楝去核芫花米醋浸炒各半兩

右為細末麵糊丸如麥米大熟水下空心一服臨睡一服

治小兒狐疝傷損生癩出聖惠方

芍藥 茯苓各十八銖 防葵一作防風 大黃各半兩 半夏 桂心 蜀椒各六銖

右為末蜜和丸如豆大每服一丸日午服可加至三丸

玉蟾煮視藥出端竹堂歌曰三歲嬰兒性不調休教少子放

踈嬌一張衲被幪頭側自有神仙路一條

山茱萸　蛇床子　壯礪　川椒　吳茱萸　葱白帶鬚各等分

右㕮咀每服用三錢㸆水熏洗患處

硃砂丸出御藥院治小兒疝氣

硃砂一錢研　當門子一枚如皂子大重分半　石燕子燒醋淬五遍　史君子末　訶子炮出核為末各一錢　木香三字

右為細末用米飲為丸如黍米大從一丸至七丸薄

荷湯下日二服早晚乳食前各一服

當歸散出直指方治疝氣大腑秘小腹陰囊牽引撮聚痛甚

辣桂　牽牛炒取仁各半兩　北大黃　桃仁浸去皮焙各二錢半　全蝎一錢

右剉散每一錢入蜜煎溫服已利後以青皮陳皮茯苓木香縮砂甘草為散生薑煎和胃唇青不治

壯丹九一名桃仁九出聖惠方治小兒疝氣

桃仁炒去皮二錢　壯丹　白蒺藜炒去刺　桂心各半兩　郁李

仁去皮炒
一錢

右為末煉蜜丸如小豆大三歲用三十丸温酒下一
方治小兒腹虛冷因多啼氣下致令陰腫加黄檗半
分微炙用

茴香散出全嬰方治小兒疝瘕氣攻陰核腫大

茴香炒　川楝子去核　牽牛　巴戟各等分

右為末三歲半錢燈心湯調下一方牽牛為末糊丸
小豆大三歲三十丸米湯下常服尤佳

香附丸出朱氏集驗　治膀胱疝氣外腎腫痛

牽牛炒　香附子炒　石燕煆紅酒浸研　巴豆七粒同牽牛炒去巴豆

右末為丸用蕳麻湯下

金鈴散出危氏方　治疝氣作痛時先曲腰啼哭眼中無淚脚冷唇乾額上多汗或外腎釣上陰囊偏大

金鈴子一兩炒去核　縮砂七錢半去殼　葉澄茄　木香各五錢

右為末每服一錢大者二錢鹽湯或好酒調服

煨棗方　治小兒腸氣痛

斑蝥不去頭足十箇　大棗一枚去核

右將斑蝥入大棗內濕紙包煨香熟去蝥空腹食棗

桂心湯下

治小兒狐疝氣偏墜有大小時時上下者出濟生拔萃

蜘蛛十四枚熬焦　桂半兩

右為散每服一錢日再酒調下蜜丸亦可

治小兒寒疝腹痛大汗出出肘後方

濃煮梨葉汁七合頓服以意消息可作三四度飲之

大良

治小兒疝氣并腎氣

以葛袋盛鹽於戶口懸之大人以手撚抖盡即愈

治小兒疝發時腫痛如刺全嬰方

以生射干汁取下飲之亦可為丸服之

紫蘇子丸出楊氏家藏治臟寒氣疝腹痛加木香

真紫蘇子揀淨一兩陳橘皮去白各一兩高良薑桂心人參各半兩木香一分炮

右為末煉蜜丸如芡實或如圓眼細嚼米飲下小兒白湯化下一丸霍亂吐瀉急服煎霍香湯下尤妙

備急方出楊氏家藏　治證同前

沉香　木香

右以水磨濃傾小盞內逐次磨一服許煎數沸即服無不作効

茴香散朱氏集驗　治小兒弔疝大人膀胱疝氣痛

京三稜炮　茴香炒　甘草　沒藥

右等分為末煎鈎藤湯調下葱湯亦可

桃仁湯出朱氏集驗方 治弔疝幼雛服之取効

木饅頭切碎用葱炒 桃仁鹽炒

右二味等分為細末每服二錢温酒下

治偏墜吊疝方出朱氏集驗方

正氣散一貼入鈎藤煎服即愈

壯丹丸 治小兒陰疝偏腫

壯丹皮 豉炒 防風去叉 黄蘗去粗皮微炙 滑石別研 桂去粗

皮各一兩

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五丸米飲下早晨日晚各一服量大小加減

治吊氣出朱氏集驗方

鉤藤乾薑甘草各等分

右為末湯點下

吊腹氣痛未成者出鮑氏方

蘿蔔子 茴香 枳殼 甘草各等分

右為散煎入少蜜再煎服痛甚者加少木香

又方出鮑氏方

蓬朮 枳殼 木香 甘草半兩 沒藥二錢 乳香一錢 鈎藤勾炒半兩

右為末蜜丸如芡實大鈎藤湯下量與服

立甦散出朱氏集驗方 治小腸氣

蝲蛑九個去毒 馬蘭花二錢水浸一宿 木香一錢 沒藥半錢 胡椒為末半錢

右為末蘭香酒調下

陰腫 附論

夫陰腫核腫者由兒啼怒嘔氣逆不順乘虛而行陰偏大又因甘肥不節生冷過度致生疳氣結不行流入陰中更或傷暑毒或觸風邪使血氣與邪氣相搏停結不散則成陰腫巢氏曰邪氣衝於陰與血氣相搏則成陰腫　小兒陰腫者為足少陰為腎之經其氣下通於陰小兒有少陰之經虛者而為風邪之氣衝於陰與血氣

相搏結則令陰腫也　人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫苟腎經氣虛或坐石不起冷氣旋之或近地經久風邪濕氣傷之不為陰腫幾希矣間有啼叫怒氣閉繫於下結聚不散加以水濕不行亦能發為此疾

方

治小兒核腫壯熱有實　千金方

青木香　甘遂　石膏　甘草各十八銖　麝香　大黄

前胡各一兩　黃芩半兩

右㕮咀以水七升煮取一升九合每服三合日四夜二

甘遂丸出聖惠方　治小兒陰腫壯熱

甘遂一分煨令微黃　麝香一分細研　川大黃對微炒一兩　前胡二兩去蘆頭　黃芩半兩　木香一兩

右為末煉蜜和丸如菜豆大三歲兒每於食前以溫水下三丸量兒大小以意加減

三白散出肘氏方治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二兩 桑白皮 白朮 木通去節 陳皮去白各半兩

右為末每服二錢薑湯調空心服治盤腸氣釣先服此後服鉤藤膏

桃仁丸出肘氏方治啼叫怒氣閉繫於下結聚不散水竇不行

桃仁去皮尖麸炒三分 辣桂 牽牛炮取仁 牡丹皮 白蒺藜炒搗去刺 北大黃各三錢

右為末煉蜜丸如麻子大每服五丸或七丸青皮木通葱白鹽少許煎湯灌下或煎大流氣飲研青木香丸灌下一方無辣桂

大黃散出聖惠方治小兒陰腫

大黃一分木通一分桑根白皮半兩羌活一分川朴硝三分

右搗羅為散一二歲每服一錢水一小盞煎五分去滓温服量兒大小分減

海蛤散出醫方集成治小兒陰腫由啼叫怒氣繫於下乘虛

而行故成此疾宜服

海蛤　懷香子炒各三分　薏苡仁　白朮　檳榔各半兩麪裹煨

右為末食前温酒調下半錢量兒大小以意加減

治小兒氣卵之疾

破故紙　蘿蔔子　黑牽牛　橘核各等分各炒焦黄色

右為細末酒糊丸如菉豆大每服三十丸鹽湯下

壯丹丸出聖惠方治小兒陰腫為腸虚冷多啼軀氣下所為宜服

壯丹　桂心　郁李仁去皮微炒各半兩　桃仁一分去皮尖雙仁麩炒微黄

右搗羅為末煉蜜丸如麻子大一二歲每服以温水下五九早晨午後各一服量兒大小加減

牛蒡膏出聖惠方治小兒陰卒腫脹痛

生牛蒡汁二大盞熬如膏赤小豆末半兩肉桂末一分

右藥相和如膏塗兒腫處立消

漆燕散　治小兒陰核氣結腫大或偏腫疼痛

漆燕一枚入瓦瓶内鹽泥固濟陰乾炭火燒通赤為度放冷研令細續隨子去皮一分

右為細散每服半錢米飲調下

治小兒陰腫出聖惠方

小荳一合 川大黃半兩劉生用

右為細散用鷄子白調塗兒陰腫處乾即易之

蛇床仁湯熨方出聖惠方

蛇床仁一兩 柳蚛屑一兩

右藥以水一大碗煎六七沸洗之取其滓以帛裹熨兒腫處

治小兒陰腫出聖惠方用狐莖炙搗為末酒服之下半錢

又方出千金方用斫桑木白汁塗之

又方出千金方用搗蕪菁塗之

又方出聖惠方用搗垣衣傅之

又方出聖惠方以衣中白魚傅之差一方書中白魚

鷄翅散出全嬰方治小兒陰核腫大

用鷄翅六莖燒灰京三稜煎湯調塗左腫用左翅右腫用右翅一方單有鷄翅燒灰服之古今錄驗云治陰大如斗

三稜散出全嬰方治小兒陰疝核腫

用京三稜麵裹煨焦去麵將三稜為末二歲半錢空心鹽湯下大小加減

蟬蜕散出危氏方治陰囊忽腫多坐地為風或蟲蟻吹著用蟬蜕半兩水一碗煎湯洗腫處其痛立止腫亦消再温再洗後仍與五苓散加燈心煎服

地龍膏出直指方治外腎腫硬或疝或風熱暴腫及陰瘡用乾地龍不拘多少為末先以葱椒湯於避風處洗次用津唾調傅其上外腎熱者鷄子清調傅或加壯

蠟少許亦可一方加葱液調塗一方只用地龍糞生薄荷汁調塗尤妙

牡蠣散出危氏方治外腎腫大堅物通明

用牡礪粉研極細先以津唾塗腫處次用糝傅

治卵腫出危氏方

研桃仁唾調傅亦治婦人陰腫燥痒一方治兜陰腫以桃仁研為膏溫酒化下豇豆大服之日三服大小加減

遇仙方出危氏方治風熱腎熾赤腫痛日夜啼叫不退數日皮如鷄卵殼愈而復作

用老杉木燒灰入膩粉清油調傅効昔滁州趙使君云長子數歲時患此證忽見一道人說此方一傅遂愈

五苓散出危氏方治陰核氣結腫大釣痛因啼怒不止傷動陰氣結聚不散得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉加以風冷血水相聚水氣上乘於肺故先啼

而後疝痛外腎木硬臍下痛楚不可忍惟利二便則安以木通葱白茴香食鹽煎湯調下得小便利為効

治小兒陰卒腫痛出聖惠方用蔓菁子末以猪脂調傅之

又方出聖惠方用馬鞭草爛搗裹之日二易之

水萍散出全嬰方治小兒陰囊腫色如琉璃又治瘡瘡入目用浮萍草為末三歲煎葱白湯調下一錢

治小兒地風或蟲蟻咬着陰腫出經驗良方用葱地内蚯蚓糞甘草汁塗一方無甘草水調塗

治小兒陰腫出千金方用猪屎五升水煮沸布裹安腫上

皂角膏出危氏方瀉腎氣治腎經有熱陰囊赤腫釣痛大腸祕澁

大黃五錢黑牽牛半生半炒猪牙皂角各一兩

右為末煉蜜丸菉豆大每服七粒温水空心下

茴香散出楊氏藏方治小兒外腎腫大腸閉作痛

香附子去殼巴豆二十七粒炒焦去巴豆不用茴香炒各半兩

右件為細末每服半錢煎紫蘇湯調下如是三歲以

上服一錢乳食前空心下

立消散出楊氏家藏方治小兒陰腫脹痛

赤芍藥　赤小豆　枳殼麵炒去穰

右件等分濃煎桕枝湯調藥傳腫處乾即以桕枝湯潤之

桃仁方出醫方如選治小兒足少陰之經虛而受風邪者衝於下經則成陰腫病宜用經効

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃三分　牡丹半兩　白蒺藜半兩微炒去刺　桂

心半兩 郁李仁湯浸去皮微炒一分

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如黍米大每服十粒以温酒下乳食前量兒大小加減

治百二十日内陰腫如柿大者出朱氏集驗方

大黄 黄芩 黄連 黄柏

右各等分燒留性為末以雄猪膽汁調抹服則消毒散血

一方出海上方治小兒陰囊虚腫以生甘草調地龍糞塗之

治小兒陰囊腫脹明亮出本草用石灰湯放温洗之數次立効

治小兒外腎腫痛出朱氏集驗方

生地黄　甘草

右各等分為末煎服立効

又方出朱氏集驗方五苓散煎蘿蔔子湯調下即愈

偏墜附論

夫小兒偏癩者是陰核偏腫大亦由啼怒軀氣不正所

致其偏者乘虛而行故謂偏結也

方

防葵丸出聖惠方治小兒陰偏大卵核堅硬

防葵 牡丹 桂心 黃蘗 剉滑石 以上各一兩

豉半兩微炒

右㮈羅為末煉蜜和丸如麻子大三四歲兒以粥飲下五丸早晨晚後各一服量兒大小以意加減

五等丸出千金方治小兒陰偏大又陰核堅癩方

黃藥　香豉　牡丹　防風　桂心　各二兩

右為末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至十丸兒小以意酌量着乳頭上服之

乳香丸一名妙香丹出全嬰方　治小兒疝氣偏墜

乳香　青木香　昆布洗各三錢　牽牛炒　藿香　各半兩

右為細末煉蜜或棗肉丸如小豆大三歲二十丸鹽湯送下一方用牡蠣湯下

懷香子丸出聖惠方　治小兒偏墜或氣攻小腹疼痛

懷香子（微炒搗末）古文錢青（細砂細研各一分）細硇砂（研）桃仁（四十九枝去皮尖雙仁生用）

右研令勻湯浸蒸餅和丸如麻子大二三歲每服以橘皮湯下三丸

萬靈丸出全嬰方治小兒疳氣偏墜

京三稜（濕紙裹煨）茴香（炒各一兩）斑蝥（一錢炒去頭足）

右為末酒糊丸如小豆大三歲五丸茴香湯下食前常服漸退住藥

壯丹散出濟生方治小兒卵腫偏墜用防風丹皮等分為末每服二錢温酒調服鹽湯亦可又千金方取生白頭翁根三月上除日取者佳搗隨偏腫處傅一宿當作瘡二十日愈治陰癩偏大又聖惠方治偏墜或氣攻小腹疼痛用蛇床仁末半兩馬鞭草汁一合相和如膏塗陰腫處效又本草治小兒偏墜服防葵丸令兒坐於土中午時炙卵下偏墜處七壯石蠶子丸出楊氏家藏方治小兒啼哭軀氣不正動繫於陰偏

墜腫脹小腹作痛

木香　檳榔各一錢　石鬱子二枚火炙醋淬七遍　史君子肉一錢　郁李仁一分湯浸去皮尖研如膏

右件前四味為細末次入郁李仁同研勻煮麵糊為丸如黍米大每服十丸煎紫蘇陳橘皮湯送下乳食前

金鈴散出楊氏家藏方　治小兒陰核偏腫疼痛往來

金鈴子一兩取肉微炒　馬蘭花炒黃　茴香炒黃　蒔蘿三味各半兩

右為細末每服一錢煎木瓜湯調下乳食空心服

癩疝 附論

夫小兒核氣結腫大者癩疝也由稟受之月肝經虛弱因啼怒軀氣筋脉下墜繫於陰氣則筋脉緩縱結聚不散是為癩疝也若氣偏虛則其腫亦偏蓋足厥陰肝之經環陰器抵少腹是動則為癩疝少腹痛

方

狐陰丸　治小兒陰癩

狐陰一具炙黃 斑生蟲十四枚炙微黃 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 乾薑炮 蒺藜子炒去刺 細辛去苗各三分 桃仁湯浸去皮尖雙仁炒別研 卷柏各一兩半

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒米飲下五丸空心日晚各一服量大小加減一方有消石亦作滑石

昆布丸出聖惠方 治小兒癭疝攻注連腎外囊腫脹或疼痛偏墜

昆布三分洗鹹味　懷香子半兩微炒　木香　甘草炙微赤剉　黃蘗
剉丁香　爛壯蠐生用　銅青已上各一分

右為末用熟棗肉為丸如麻子大每一二歲兒煎甘草湯下三丸量兒大小加減

桃仁丸　治小兒陰癩日夜疼痛

桃仁三分湯浸去皮尖雙仁微炒　川大黃半兩剉微炒　赤芍藥半兩　防葵半兩　夏一分浸洗七遍去滑　桂心一兩　赤茯苓半兩　川椒一分去目閉口者微炒去汗

右為末煉蜜和丸如菉豆大每三歲兒食前以温酒下五丸量兒大小虛實加減一方治小兒陰癇氣疝發作無時者一方無桃仁防葵名芍藥丸

白蒺藜散出聖惠方治小兒陰癇不消

白蒺藜半兩微炒去刺　香豉半兩微炒　鼠婦　蠷虫微炙　川大黃劉微炙　桂心　細辛已上各一分

右為細末一二歲兒每服以温酒調下半錢早晚後各一服量兒大小加減

薏苡仁散 出聖惠方 治小兒癩疝

薏苡仁　芍藥　土瓜根　蛇床子 微炒　黃芩 去黑心
桔梗 炒　蛇含 各三分

右搗羅為散一二歲兒每服半錢七空心溫酒調下日晚後再服量大小加減一方治小兒陰癩腫硬或時疼痛無蛇含有地膚子

木香散 出聖惠方 治小兒陰癩腫脹

木香　白蒺藜 微炒去刺　地膚子　昆布 洗去鹹味　枳殼 麵炒

令黃去猴 梔子 已上各一分 具醋炙 狐陰一令焦黃

右搗羅為末一二歲兒空心以粥飲調下半錢晚後再服量兒大小以意加減

治小兒陰癩腫大不消方 出聖惠方

硼砂一分

右以水研化塗之立効

治小兒陰癩 出聖惠方 取覓菜根搗碎傅之立差馬鞭草傅亦佳

蒺麻丸　治小兒癩疝

蒺麻仁三十枚　棘刺子去皮二十枚　石燕子燒一枚　滑石末二錢　麝香研半錢

右為末麵糊和丸如菉荳大每服五十丸空心煎燈心湯下

魁蛤散出聖惠方　治小兒陰癩衆藥不効

魁蛤三分細研　狗陰一具炙令黃　白朮半兩　桂心一分

右搗羅為末一二歲兒每於空心以粥飲調下半錢

晚後再服酒下量兒大小加減

韭子丸　治小兒陰癩

韭子炒二兩半　附子炮製去皮臍三分　狐陰一具炙黃

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五丸米飲下早晨夜卧各一服量兒大小加減

三應散　治小兒肝經虛弱筋脉緩縱氣脉下墜陰氣腫大久成癩疝

懷香蟲一枚研汁　腻粉二錢七　胡黃連末一分

右同研令乾每服一字七陳米飲調下不拘時

滑石丸　治小兒癩疝腫鞭疼痛

滑石碎　澤蘭各二錢　粉霜一錢　續隨子去皮半兩

右為末白麵糊和丸如菉豆大五歲以下五丸五歲以上七丸豆蔻酒下空心臨卧服

土瓜根散出千金方　治小兒氣癩并陰癩腫硬時復疼痛

土瓜根　赤芍藥　當歸各一兩

右㕮咀以水二升煎取一升服五合日二

桂心散出千金方治小兒陰癩腫硬

桂心一兩 地膚子一兩 白朮一兩

右搗羅為細末三歲兒每服以温酒調下半錢七日三服量兒大小以意加減一方治小兒狐疝傷損生癩以蜜為丸白酒服之亦可治大人

治小兒癩及陰癩腫硬

用蜥蜴二枚燒末酒服之一二歲服半錢早晚各一服量兒大小加減

木通散　治小兒癲疝發作疼痛

木通 到 膽礬 研各一分

右研為散每服半錢七米飲調下

治小兒癲疝腫痛偏墜或氣攻小腹疼痛

用枳殼三兩微炒搗為散每用柏枝煎濃汁調厚塗兒囊腫處妙

治小兒陰癲日夜疼痛

用蝟皮一箇燒存性研細臥熱酒調下一錢七

治小兒陰癩陰癩核大小也取杜父魚擘開口咬之七下此魚生溪澗下背有刺黑班如吹砂而短也大頭開口長二三寸色治小兒卵癩用桃仁細研傅之

諸蟲附論

夫小兒有九蟲一曰伏蟲長四分二曰長蟲一名蚘蟲長一尺貫心則殺人三曰白蟲長一寸長至四五寸亦能殺人四曰肉蟲狀如爛杏令人煩滿五曰肺蟲狀如

蠶令人嗽欬六曰胃蟲狀如蝦蟇令人嘔吐喜噦七曰弱蟲又名萬蟲令人多唾八曰赤蟲狀如生肉令人腸鳴九曰蟯蟲狀如蝸蟲令人下部中痒九蟲之中三蟲最甚而為病之尤者莫如蚘由小兒氣血不調臟腑虛弱或食生冷或嗜肥甘胃中氣緩故生諸蟲者腸胃之間多則為痒劇則為癩或因瘡瘍變成癰疽惡瘡又有寸白蟲者長一寸色白小褊因食生魚牛脂冷物或飲乳致生此蟲損人精氣令人心腹痛長若及一尺亦能

殺人凡此諸蟲品類不可悉數皆可通以化蟲藥治之欲知蟲證者凡腹痛之脉當沈弦若反洪大者蚘也肘外垢聚甚者蟲也　蟲痛者由兒三歲之後甘肥不節生冷過度食生粟炙肉魚生皆致生蟲其蟲因臟腑虛弱而動或食甘肥而動或胃冷而動或胃熱而動動則上下往來腹痛攻心疠疼叫哭仰身揮手心神悶亂吐涎吐沫或吐清水飲食不成膚沉默默其蟲不療傷心害人保生云蚘蟲九蟲之數腹中皆有之小兒食乳而

哺早或食甜過多胃虛蟲動令兒腹痛惡心口吐清水腹上青筋是其證也

方

烏梅丹出醫方妙選　治小兒久痢蟲動及傷寒蛔厥並宜服之

烏梅肉一百枚炒焦　川黃連三兩　乾薑二兩　當歸洗焙乾二兩　附子一兩炮製去皮臍　細辛一兩刮去粗皮　桂一兩去蘆頭　人參一兩去　蜀椒一兩揀去閉目雙仁者炒香熱出汗　黃蘗一兩

右為細末煉蜜和丸於石臼中擣一二百下丸如黍米大每服十粒米飲下量兒大小加減

大蘆薈丸　治疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連　黃連　白蕪荑去扇秤　蘆薈　木香　青橘皮　雷丸　鶴虱微炒各半兩　麝香研二分別入

右為細末粟米飯丸如菜豆大米飲下一二十丸無時

議曰小兒疳積蟲積皆由食肉太早脾胃本弱受之

不磨癥傷不化何況更加以肥膩冷硬之物腸胃虛怯因積生蟲只有三種蛔苗胃也蛔多令兒喜食滋味肉脯之物腹肚緊脹心胃膨滿苗多令兒消瘦神困肚脹青筋疳氣漸盛腸鳴瀉臭食即嘔噦胃多令兒喜食酒肉食不生肌常作困道嗔脹脇煩躁迷悶眠不安蓆並宜服此其蟲自化盛用利下仍須調胃和氣助之

下蟲丸出活幼口議

治小兒多蛔蟲苗蟲食蟲疳蟲血蟲並

宜服之

鶴虱炒一錢　光粉炒二錢　膩粉三大錢七　史君子一百箇炒　檳榔一錢生　龍牙根二錢生　貫衆子午卯酉日採取百方驗綠色者炒焦二錢　龍膽根二錢　苦楝根皮酒炙二錢

右為細末水煮麵糊為丸如麻子大每服三五十丸空心食前甘草湯下或以猪肉清汁羹服之尤妙仍以調脾和胃佐之

貫衆丸　治小兒九蟲

貫衆一兩一分去白蟲　蘼蕪去長蟲　狼牙各一兩去胃蟲　蜀漆去燒蟲　雷丸一兩半去赤蟲　白薑蠶去弱蟲　厚朴去粗皮生薑汁炒去肺蟲　石蜜去蚘蟲各三分

右為末煉白蜜和丸如麻子大每服量兒大小加減四五歲以苦酒漿下五丸空腹服之以知為度未知稍加至十九

治小兒香煎丸　治小兒蟲動腹啼吐口吐涎沫

乳香　沉香各一錢　肉荳蔻一箇煨　百草霜　木香

丁香 各一錢　巴豆一十四粒出油如霜

右為末煮酒封頭蠟和丸如菉豆大每服三五丸淡生薑湯送下如患肚痛不止服之大効常服以通為度又云此方加沉乳二香藥即名感應丸宜療小兒虛中積證冷積癥積痃積食積脾氣乳積盤腸蟲痛及胃久虛臟腑中脘不和痞氣欝結或瀉或痢或嘔或噦腹肚疼痛兒體虛羸不堪動轉者並與服之此方比珍珠丸等取積大不同只恐服此未能通利

若已通利誠為之幸如胃仍虛當以和脾生胃之藥斟酌用之一方釣藤湯下凡用藥下蟲須在月初蟲頭向上可下仍須空心凌早下後以和胃藥調之

史君子餅　治因喫食粗肉肥甘生熱肌瘦體虛口吐清涎唇間紫色腹中絞痛口鼻中出黑色蟲不治

史君子 四十箇去殼　雷丸 半兩　定粉 二分　輕粉 半錢　青箱子 鶴虱 各一分

右為末用鷄鴨卵和蒸為餅先將此藥隔日夜五更

服後葱湯九取下

化蟲丸　治小兒好食炭土不長肌膚五心煩熱鼻赤齒搖

蕪荑　黃連　神麴　麥蘗　烏梅已上各微炒　陳皮去白各等分

右為末麴糊丸黍米大空心米飲肥猪汁尤佳量兒大小下一二十丸

白鮮皮丸　治小兒諸蟲大啼時作心腹脹

白鮮皮半兩　苦楝根半兩　鶴虱炒半兩　定粉　青橘皮湯浸去白焙半兩　石灰一分

右為細末麵糊和丸如菉豆大每服十丸煎史君子湯下不拘時候

奪命丹　治小兒蟲動不止攻心危困

狼牙草　扁竹　苦參各一兩　雷丸　鶴虱楝淨薏苡仁各半兩

右為細末糯米飯和丸如黍米大每服十粒取生地

黃汁下量兒大小加減

棕櫚散　治小兒痔疾皆由勞傷過度損動血氣其裏有蟲甚細

棕櫚一兩燒灰　荊芥一兩去枝梗　側柏一兩炙黃　牛膝半兩　枳殼半兩

黃耆半兩

右為細末每服半錢米飲調下乳食前

遣蟲丸　治小兒蟲動腹動啼叫口吐涎沫

檳榔　蕪荑　雷丸　定粉　鶴虱炒各等分

右為末煎苦楝根湯和丸如小豆大每服三十丸煎史君子湯送下食前又云如蟲攻下部燒艾烟熏安蟲散　治小兒哭物粗肌膚消瘦蟲生腹內極痛不可忍者終日啼哭或平時哺食甘肥油膩不知節省或因臟腑虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中疼痛發作腫聚往來上下痛無休止亦攻心痛叫哭合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫吐清水四肢羸困面色青黃飲食進不生肌膚或寒或熱沉沉嘿

嘿不的知病之去處其蟲不療則子母相生無有休止長一尺則能害人及治蟲咬心痛來去不定不思乳食一名化蟲丸一名鶴虱散

真胡粉炒 檳榔 川楝子肉炒去核一方用苦楝根去浮皮 鶴虱炒各二錢半 白礬二兩生用

右為末米飲調痛時及空心服之或以麵糊為丸如麻子大一歲兒服五丸溫漿水入生清油一二點打勻下溫米飲下亦得不拘時候其蟲細小者皆化為

水大者自下一方化蟲丹月初服尤妙

化蟲散

雷丸二錢　使君子十箇　鶴虱一錢　生大黃一錢　甘草一錢

右為末肉汁調服

千金散　治小兒疳蚘動心痛面伏地臥口吐清水瘦涎

白檳榔劉一錢　紫楝根劉　石榴根皮劉　鶴虱炒令煙出　蘆薈研各半兩

右為散空心熱茶調下一錢匕更看小兒大小加減

一方無蘆薈用生乾地黃一方忌飴糖黏滑食

化蟲丸　治小兒寒熱傷脾蟲痛瀉青黑色減乳食

木香一分　檳榔炒二枚　胡粉　苦楝根　鶴虱炒各二分

右為末麵糊丸如麻子大一二歲兒每服十丸溫粥飲下日二差即止

鶴虱散　治小兒蟲痛面好伏地口吐清水

鶴虱炒　苦楝根各一分　檳榔剉一枚　牽牛子炒一分　史君

子去皮十枚

右為散每服半錢七米飲調下

檳榔散　治蟲痛

檳榔　貫衆　石菖蒲　木香　甘草各一兩

右㕮咀用水一盞煎服

黑金散出醫方妙選　治小兒蟲煩預先服之得眠睡為驗

乾漆二兩　肉桂一兩　草豆蔻半兩　石榴根半兩　精明雄黃半兩

水磨者

右於瓦器中燒存性搗羅為末乳鉢内研極細每服一字至半錢研入麝香少許煎粟米調下量兒大小加減

補胃膏 出醫方妙選

治小兒腹痛不可忍者瀉利蟲煩

高良薑 一兩 微炮
肉桂 一兩 刮去皮
肉豆蔻 半兩
乾漆 半兩 燒存性
烏梅肉 半兩 炒乾

右為末煉蜜丸如鷄頭子大每服一粒至二粒米飲化下乳食前一方有白朮無烏梅肉麵糊丸如粒米

大

蝟皮散出醫方妙選　治小兒痔疾皆由勞傷過度損動血氣其裏有蟲甚細

蝟皮一兩燒灰　鱉甲一兩塗醋炙黃去裙襴　蛇蛻皮一兩燒灰　露蜂房半兩微炒　麝香一錢

右為末每服半錢米飲調下量兒大小加減

香雷散出醫方妙選　治小兒諸蟲動啼叫不止

雷丸　鶴虱　苦楝根　淡蕪荑各半兩

右為末每服一字至半錢用生精猪肉汁調下食前服

勝金丸　治小兒疳蟲痛取効

龍膽　定粉　研　黃連　去鬚　烏梅肉　炒　各等分

右為末煉蜜丸如麻子大每十丸米泔下

檳榔散　治小兒蟲痛頻發面青嘔吐冷痰漸漸肌瘦

檳榔　劉一枚　酸石榴皮　劉　苦楝根　劉　陳橘皮　湯浸去白焙　各一分

右為散每服半錢七米飲調下食前服

赤石脂丸　治小兒胃虛蟲動

赤石脂細研二錢　肉豆蔻燒存性二枚　橡實五枚　良薑子淘去浮土五枚

右為橡實并良薑一處炒令黑色與赤石脂豆蔻同搗羅為末入蜵酥少許用麵糊丸如黃米大每服五丸米飲下蟲痛煎苦楝根湯下小兒瀉泄頻服良

乾漆散永類鈐方　專治小兒疳蟲腹痛

乾漆 炒煙出 一錢　史君子 取肉十四枚　楝木皮 東邊皮厚者暴乾去粗皮 一兩　蕪荑一錢半

右為末每服一字二三歲半錢四五歲一錢砂糖熟水調下一日三服

化蟲丸 出楊氏家藏 治因疳生蟲五心煩熱

蕪荑 炒　黃連 炒去蘆　神麴 炒　麥蘗 炒去芽 各等分

右為末麵糊丸如黍米大空心米湯下一方用猪膽汁麵糊為丸米飲下肥猪肉汁尤佳

黃金散出醫方妙選　治小兒吐痢腹蟲動者

乾漆一兩　白蕪荑　肉豆蔻各半兩　精明雄黃三分細研

右研細每服半錢葱白湯入生油一點同調下須調令勻熟藥冷即再温動乳前服

安蟲丸一名川楝丸出錢氏方　治上中二焦虛或胃氣蟲咬心動及痛

乾漆三分折碎炒烟出盡　雄黃一分　巴豆霜一錢

右為細末麵糊丸黍米大看小兒大小與服取東引

石榴根煎湯下痛者煎苦楝根湯下或蕪荑湯下五七丸至二三十丸發時服

萬安散　治小兒疳渴蟲動心痛

蝦蟇　蛇蛻皮　蟬殼　各等分燒

右為散用麝香半錢同研每服一字七日午温水調下午後煎柳枝湯浴用青紗帛子蓋之其蟲自出

蕪荑散　出聖惠方　治小兒寸白蟲蛔蟲動作多吐清水

白蕪荑一兩半　狼牙草一兩　白蘞半兩

右為散每服半錢七以苦酒二合空心調服立差

化蟲散　治小兒蟲痛不可忍

白丁香一錢　檳榔一劄一枚　雷丸一錢

右為散每服一字或半錢七米飲調下孀食後服

滴金丸　治小兒蟲動心腹痛

雄黃　麝香各半錢　白礬三錢

右為末粟米飯和丸如麻子大每服五丸煎苦楝湯下

化蟲丸　治小兒疳蟲疠刺腹痛及蛔蟲常服化其蟲去根

蕪荑一分　檳榔刻二錢　鶴虱炒半兩

右為末猪膽丸如麻子大每服五丸七歲十丸陳米飲吞下一日三服

治小兒三蟲出千金方

雷丸　芜荑各等分

右為末每服一錢七日三

蕪荑散出全嬰方治上中二焦虛或胃寒蟲動及痛小兒蟲咬心痛面青唇紫口吐涎沫可食

白蕪荑去皮秤　乾漆各等分

右為細末每服一字半錢或一錢米飲調下發時服

靈白散一名靈礬散出醫方集成治蟲咬心痛欲絕

五靈脂二錢　白礬枯半錢

右研勻每服一二錢水一盞煎至半盞溫服當吐出蟲為効

史君子餅 出經驗良方 取疳蟲蟲

史君子 鷓鴣糞 各等分

右為末鷄子一箇打破併藥為餅蒸熟五更初食其蟲立可出

麝香散 治小兒諸蟲及一切疳蟲

麝香 研一分 夜明砂一兩

右為末每服半錢乞葱白湯調下

楝實散 治小兒蟲痛

楝實　鷄糞等分

右為散每服半錢七冷水調下

治蟲方出經驗良方

用乾漆一兩搥碎炒令烟盡出油用新汲水入生麻油空心吞下一方調下一字不過三服當取下蟲即差

治小兒疳蟲

取羊蹄葉作菜食之良亦解胡夷魚鮭魚鱣魚之毒

治小兒因喫食粗肥甘生熱肌瘦體虛口吐清涎唇間紫色腹中絞痛口鼻中出黑色蟲不治

用四君子湯每服二錢苦楝根少許煎湯調服

治小兒蟲證　腹痛啼哭如口角青者蟲證也抱起稍止臥之則大啼蓋臥則蟲攻上起則蟲攻下故也出經驗良方

以平胃散加生硫黃一粒如小指大煎服痛即止

又方

用白蕪荑檳榔各一兩蒸餅為丸每服二十丸熟水下

治小兒蟲出經驗良方

用石榴皮桑白皮椿皮苦楝根皮等分為末水煎服

治小兒諸蟲疼痛不止者

以史君子火煨為末以穀煎湯送下宜於月初四五間服之其蟲自下

化蟲丸出仁存方

鶴虱去土 胡粉 檳榔 白礬半生半枯 苦楝根各半兩 蕪荑 黃連 酸石榴皮各一分

右為末以麵糊丸如麻子大一歲兒三丸漿水入香油三五滴下其蟲小者化為水大者自下加雷丸或用猪瘦肉湯下亦可

化蟲丸出直指方 治蟲痛

蕪荑 川鶴虱 鷄心檳榔 乾蝦蟇炙焦各一分 蘆薈

右為末雄猪膽汁為丸麻子大每服五丸陳皮飲下或史君子煎湯送下凡蟲月首則頭向上凌晨可服藥

人參湯　治小兒疳蟲咬心痛不時日夜不睡

人參　桂去粗皮　桃柳枝剉焙　狼牙　乳香研　青橘皮去白焙炒　吳茱萸湯浸焙炒各一兩　古老錢四文火煆

右粗搗篩每服一錢水六分煎至四分去滓温服量兒大小加減服之

楝根湯　治小兒蚘蟲攻心痛

楝根皮有子者酸石榴根　槐根各一握切碎用東引者

右以水三盞煎取一盞去滓空心頓服以藥盡合之即瀉蟲出仰之即吐蟲出神驗量兒大小加減

夏少保傳經驗蟲動痛極不可忍方

用乾漆半兩檳榔一箇生用窑老一塊再煆細研三件一處為末空心熱酒服良久取下少保門子之兒十歲心痛危亟服藥不痊遂用此方取下蟲即愈

化蟲丸　治小兒脾胃虛弱面黃肌瘦或大便有蟲出或有諸蟲腹內作痛並宜服之

乾漆炒烟盡二錢半　雄黃另研水飛二錢半　蕪荑另研極細二錢半　狗脊劉各二錢

巴豆霜十錢

右先將乾漆狗脊為細末次入雄黃蕪荑巴豆霜同研勻水麵糊為丸一二歲兒如粟米大每服五七丸三四歲如麻子大每服七八丸乳汁送下或煎石榴湯送下或煎蕪荑湯送下更効日進二服如有蟲即

時化作濃水便下大効

抵聖散　治小兒殺蟲定疼痛

苦楝二兩　白蕪荑半兩

右為末水一盞藥末一錢煎取二分放冷待發時服之

雄麝散　治小兒蟲動心腹攣痛口吐涎沫

乾漆炒青煙出　史君子炮去殼各三錢　雄黃半兩別研　麝香一錢別研

右為細末每服半錢煎苦楝根湯下

史君子散　治小兒飲食不調忽食肥膩蟲作疼痛唇青白嘔吐涎沫發渴往來宜服此藥取蟲

史君子二十枚炮去殼　蕪荑別研半兩　檳榔一錢　大腹子二枚

右件為細末次入蕪荑仁同研勻每服一錢至二錢煮猪肉湯下

香蘇散　治諸蟲腹痛疳食氣積肚緊痞氣

紫蘇　香附各二兩　陳皮製一兩　甘草炙半兩

右㕮咀薑棗煎熟服內加川芎白芷名芎芷香蘇散

內加三稜莪朮丁香史君子苦楝根皮名君子香蘇散治小兒蟲氣痛內加木瓜檳榔蘇木烏藥羌活蒼朮名行氣散多加大黃治腳氣

茴香丸　治蟲積氣痛

陳皮　茱萸　三稜　莪朮　丁香　枳殼炒　茴香炒　檳榔炒去皮　神麯　麥芽　史君子一百箇

石為末醋糊為丸菉豆大空心飯飲吞下或薑湯吞下亦可

小青木香丸　治蟲痛氣刺腹肚痞積盤腸一切等候並宜服此藥

青木香　鹽炒　胡椒　白薑　烏梅　茴香　炒

右等分為末用湯浸烏梅肉煨大蒜共搗爛和每服二三十粒空心陳皮湯下

取蟲立効丸

史君子　三錢　檳榔　半錢　輕粉　二字

右為末入煎鷄子餅少許爛飯數粒搗成丸輕粉為

衣每服四五十丸五更初肉湯吞下後進宣藥

殺蟲神妙丸

苦楝根皮 樞下二三寸炒 川楝子 石榴皮 史君子 蕪荑仁 炒 檳榔 鉛錫灰 輕粉 莪朮 巴豆 去心膜油 三稜 青皮 椎子 蛤粉 鷄子黃一枚

石等分為末醋糊為丸如麻子大每服用二三十丸空心煎桃柳條湯下或五更用茶清肉湯連進三兩服立通有効

治小兒大腹殺蟲

用苦耽苗子煮汁服亦生搗絞汁服

蛔蟲 附論

夫蚘蟲九蟲之內一蟲也長一尺亦有長五六寸者或因臟腑虛弱而動或食甘肥而動其動則腹中痛發作積聚往來上下痛有休止亦致心痛口多吐涎及清水貫傷心者死凡小兒有蟲火煨史君子與食以殼煎湯送下甚妙人多於臨卧服又無日分多不効唯於月初

四初五間五更服之至日午前蟲盡下乃以和胃温平藥一二服調理或有蟲痛發作似瘭但目不舒手不搐唯只心痛也　蛔蟲長此證候作與脾氣冷積虛積大抵相似然小兒腹肚緊脹天明叫喚吐津沫要羹肉噢方小安乃蛔蟲候脾氣多噎逆飲食不下虛中有積腹緊弔痛冷積脹緊膨滿心腹不任坐臥兩脇心膈上下攻刺疼痛脹先與下蟲丸殺蟲其蟲困次與晶丸推下餘證各與調胃藥服却推下積宜服小沉香煎丸

又云小兒疳積蟲積皆由食肉太早脾胃本弱受之不磨癥傷不化何況更加肥膩冷硬之物腸胃虛怯因積生蟲只有三種蛔苗胃也蛔多令兒喜食滋味肉脯之物腹肚緊脹心胸膨滿苗多令兒消瘦神困肚脹青筋疳氣漸盛腸鳴瀉臭食即嘔噦胃多令兒喜食酒肉食不生肥常作困頓腹脇脹煩躁迷悶眠不安席並宜服此其蟲自化蛔蟲痛面白無光心腹痛口中沫及清水出發痛有時安蟲散主之小兒本怯者多此病積痛食

痛虛痛大同小異惟蟲痛者當口淡而沫自出辛氏女年五歲病蟲痛諸醫以巴漆硇砂之屬治之不効至五日外多哭而從仰臥不安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無光睛慢唇白吐沫至六日胸高而臥不安錢詳而視之用蕪荑散三服見目不除青白色大驚曰此病大困若更加瀉則為逆至次日錢見辛曰夜來三更而瀉錢於瀉盆中看如藥以杖攪之見有藥丸錢曰此子肌厚當氣富今證反虛不可治也何以然師曰脾虛胃冷則蟲動今反目青此肝乘脾虛脾加瀉知其氣極虛也而丸藥隨糞下即脾胃已脫無形病又相應故知死病後五日足篤七日而死決矣

方

檳榔丸　治蛔厥腹痛其證愁啼乾痛吐清涎人中唇

鼻皆烏視之蛔厥多似慢驚但唇紫耳

鷄心檳榔　鶴虱　貫衆　蕪荑　川楝肉　史君子肉　雷丸　雄黃　乾漆炙存性輕粉　巴豆去殼油　木香　黃丹煅　錫灰炒不見星如灰各等分

右為末酒煮麵糊丸以用五更豬肉葱油煎臠細嚼莫吞蟲頭向上便用肉汁調化蟲散吞下檳榔丸至巳時取下蟲方可飲食化蟲散見諸蟲類

史君子散　治小兒蚘蟲

史君子 蘆薈研 乾棟皮 檳榔刮 蕪荑各三兩 肉豆蔻去殼 丁香 苦參各二兩 臘粉

右為散每服一字七空心飯飲調下

療小兒蚘蟲出本草

取萹蓄煮汁令濃飲之即差

治小兒蚘蟲出本草

以英蓮樹枝煮汁和作粥甚美以飼兒能殺蚘蟲尤妙

青箱子散出聖惠方治小兒蛔蟲發作心痛多吐

青箱子　苦參劉　黃連去鬚　萹竹　狼牙草已上各三分

雷丸一兩　雄黃半兩細研　桃仁一兩浸去皮尖雙仁麵炒微黃

右為細散一二歲無時以稀粥飲調下半錢兒稍大以意加之若下部痒綿裹少許內之日二度如不痒即勿用

槐耳湯　治蛔心痛

取槐樹上木耳燒作灰痛發煮肉碗和水調服

備急散 出聖惠方 治小兒蛔蟲疠刺心腹疼痛及蚘蟲嚙心腹痛

用鶴虱一兩搥細羅為散每服煎肥猪肉汁調下半錢其蟲便出量兒大小以意加減

治小兒蛔蟲咬心痛亦治蚘蟲

薏苡根 二兩去土剉

右以水一大盞煎取半錢去滓一二歲兒每服一合三四歲至五六歲兒二合空心服之隨大小以意加

減一方煮汁作糜食之甚香大効

桃仁散出聖惠方治小兒蛔蟲咬心痛

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒 木香 狗脊 白蕪荑 狼牙草 苦楝根皮剉 鶴虱 檳榔

右為細散三歲兒每服煎苦楝根皮湯調下半錢日三四服量兒大小臨時加減

木香桃仁丹出醫方妙選治小兒蛔蟲攻心痛不可忍

木香一兩 桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒香熱 檳榔一分 黑狗脊一兩

鶴虱一兩 揀淨 苦楝根皮半兩

右為細末豬猪膽汁和丸黍米大每服十粒點麝香湯下不拘時候

三根散出醫方妙選 治蛔蟲動啼吁不止每至月初間尤甚狀如神祟

貫衆根 棠梨根 醋石榴皮各一兩 栗刺 故綿

乾漆各半兩已上各燒灰存性

右為末每一錢用水八分煎四分去滓温服不拘時

候

苦楝根散出聖惠方治小兒腹臟有蛔蟲

苦楝根　鶴虱　薏苡根　檳榔　糯米微炒　牽牛子微炒已上各一兩

右㕮為細散三歲每服以粥飲調下半錢日三服看兒大小臨時加減

檳榔散出聖惠方治小兒蛔蟲咬心

檳榔三分　狼牙草一分　醋石榴皮三分　赤芍藥　川朴硝

各半兩

右搗為粗散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減服

貫衆散出聖惠方治小兒蛔蟲攢心合眼撲手心悶

貫衆 狗脊 狼牙草 蕳離劉各一兩

右為粗散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減温服

胡粉丸出聖惠方治小兒腹内有蛔蟲時時疙痛

胡粉三分　豬膽三枚　麝香　牛黃各一分

右研為細末用膽汁浸蒸餅和丸如菉豆大五歲兒每服以温水下七丸看小兒大小以意加減

下蟲檳榔散出聖惠方治小兒蛔蟲攻臟腑疼痛

檳榔半兩　苦楝根皮半兩劉　麝香一錢細研　東引石榴枝皮半兩劉

右㕮細羅為散入研了藥令勻五歲兒每服以熱茶調下半錢量兒大小以意加減

蕪荑散　治小兒蚘蟲咬心痛等積

乾漆炒烟盡一兩　雷丸　蕪荑各半兩

右為末温酒調服

鶴虱散出聖惠方　治小兒多吐蛔蟲

鶴虱一分　川大黃一分剉微炒　川朴硝

右為粗散都以水一大盞煎至七分去滓三歲温服半合日三服量兒大小以意加減

麝香散出聖惠方　治小兒蛔蟲咬心或吐清水

麝香一錢研入　革薤一兩剉　苦楝根一兩剉

右搥為細散以豬膽三枚取汁和令勻曝乾後却研為末每服以蕪荑湯調下半錢量兒大小以意加減

化蟲乾漆丸出聖惠方　治小兒蛔蟲咬心疼痛四肢逆冷乾嘔不吐面色青宜服此藥

乾漆二錢　膽子礬一錢

右搥羅為末用葱白湯煮麵糊和丸如麻子大二三

歲兒以石榴皮湯下二丸日三服三四歲三丸

又方

乾漆炒烟出一兩　雄黃二兩

右為細散每服半錢七油一點温水調下量兒大小以意加減

又方

胡粉一分半　臘粉一兩

右細研令勻五歲每服以粥飲調下半錢量兒大小

以意加減若用羊子肝一具煮熟切以藥末拌和與兒食之更佳

治小兒蛔蟲攻臟腑疠痛出聖惠方

醋石榴根半兩入土五寸東引者　檳榔一枚

右切碎以水一大盞煎取七分去滓入粟米半合煮稀粥空心與食蟲下更利量兒大小加減服之

治小兒蚘蟲出千金方

削棟木上蒼皮以水煮取下汁飲之量兒大小加減

一方以根白皮煮服之亦治蛔蟲用半兩一方不用蒼皮

治小兒羸瘦有蚘蟲出千金方

用檳榔二兩以水一升米二合煮取米熟出滓服之

又方出千金方

桃白皮三兩東引吳茱萸根白皮四兩

右㕮咀以酒一升二合漬之一宿漸服取瘥為度

又方出千金方

取猪膏服之亦治蟯蟲亦云煉臘月猪脂每日空心取如皂莢子大服之亦良

又方 出千金方

搥槐子用少許內下部中瘥亦治蟯蟲

又方 出千金方

楝實一枚內孔中亦治蟯蟲一方云為末用少許內下部中

殺蚘蟲方

取鼷鼠小兒食之良

治孩兒蛔蟲定疼痛

用蓴蔥子一分生為末以水三合煎取一合一日服盡

治小兒蛔蟲痔疾

用躑躅葉煎湯服之

榴枝飲治蚘蟲方出千金方

用石榴枝東行根一把水煮服之亦治寸白蟲大驗

治小兒蛔蟲定疼痛

用石竹葉煎湯服之

又方

用繰絲湯一盞服之此繰絲湯係煮繭汁為其殺蟲故也

蟯蟲　附論

夫小兒蟯蟲者是九蟲之內一蟲也形甚細小如今之蝸蟲狀亦因臟腑虛弱而致發甚者則成痔瘻瘍疥也

方

胡粉丹出醫方妙選　治小兒蟯蟲發動甚者成痔瘻瘡疥

青州大棗五十箇蒸熟取肉　水銀半兩　胡粉一兩　雄黃半兩水磨飛研

石拌勻與水銀一處拌勻用棗肉和如黍米大每服一粒苦楝根煎湯下量兒大小加減

治小兒蟯蟲蝕下部出聖惠方

槐根白皮一兩去皮剉　桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁生研　苦楝子一兩

右搗羅為末以豬膏和丸如棗核大內下部中更以

葱白兩莖去鬚水煮濃汁温飲半合

治小兒蟯蟲攻下部瘡出聖惠方

用萹蓄葉一握以水一升煎取五合去滓空心飲之

蟲即下用其汁煮粥亦佳一方搗汁服並差

大棗膏出聖惠方治小兒蟯蟲蝕下部中瘡

蒸大棗二枚取肉水銀半兩

右藥都研令水銀星盡捻為梃子長一寸以綿裹宿

內下部中明旦出蟲為効

胡粉散出聖惠方治小兒蟯蟲蝕下部

胡粉一分 雄黃一分

右藥都研令細每用少許傅下部中

治小兒蟯蟲

用桃葉一兩搥絞取汁空腹服半合亦治寸白蟲

治小兒蟯蟲蝕下部出聖惠方

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右研如膏以綿裹棗核大內下部中甚者不過三度

差

寸白蟲 附論

夫小兒寸白者是九蟲內之一蟲也長一寸而色白形小褊小兒多因甘肥不節生冷過度之所致也其蟲發動則傷人臟腑飲食不成肌膚子母相生無有休止若蟲長一尺則能害人也

方

碧金散 出危氏方 治寸白蟲蛔蟲

苦楝根一兩鶴虱半兩檳榔半兩猪牙皂角三錠燒灰史君子仁半兩各擂羅為末好青黛半兩麝香一分

右研勻每服一字用淡猪肉湯調下一方無史君子仁

除根散出經驗良方治寸白蟲

川楝子去皮檳榔各一錢輕粉一字蕪荑一錢黄丹二錢

右為末作一服取石榴根煎酒調下以五更初服先用熟猪肉嚼取汁嚥却服前藥如同嚥則令人嘔吐

青黛散　治小兒寸白蟲連年不除面無顏色體瘦少力出聖惠方

青黛一分　苦楝根一兩微炙赤剉　鶴虱一分　檳榔一枚

右為細末每服時先嚥湯肉脯少許後以粥飲調下半錢量兒大小加減服之日二三服

治小兒寸白蟲久不愈出聖惠方

鶴虱三分　雷丸三分　史君子三分　巴豆十枚去心皮研細裹壓去油

右擣羅為末以糯米飯和丸如菉豆大每服以沙糖

水下三丸量兒大小加減服之

治小兒寸白蟲連年不除面無顏色體瘦無力出聖惠方

硃砂一錢 麝香一錢 苦楝子肉一兩糯米拌炒以米熟為度

右研令細以水浸蒸餅和丸如芥子大每服於空腹服春夏冷水秋冬熱水下七丸量兒大小加減服之

檳榔散出聖惠方

治小兒寸白蟲久不愈

檳榔三枚為末 豬牙皂角三挺燒 苦楝子五枚為末

右為散每服空心煎苦楝根白皮湯調下半錢三兩

服後蟲皆出自下量兒大小加減服之

榴枝飲　治寸白蟲方見蛔蟲類

桃葉飲出千金方治寸白蟲方見蛔蟲類

下寸白蟲

用雷丸水浸去皮切焙乾為末於五更初先食炙肉少許便以一錢七藥稀粥調半錢服之日久其蟲自下

立應散一名必効散出肘驗良方治寸白蟲久不下漸羸瘦

用鷄心檳榔一箇為末以熱精猪肉四兩不用鹽醋只以酒淹切作薄片和檳榔末嚼肉下五更時以束行石榴根濃煎汁嚥下大人小兒皆可服



普濟方卷三百九十九